

1Leistungsangebot Bauchwand- und Hernienchirurgie

BAUCHWAND UND HERNIEN

primäre Bruchformen

Leistenbruch

Verschluß ohne Fremdmaterial	Shouldicereparation Alternative: Bassini (Kirschner)plastik, Bassin (Lotheissen)plastik
Verschluß mit Fremdmaterial (Netze), spannungsfrei	Lichtensteinreparation, TAPP (laparoskopisch)
Schenkelbruch	kruraler Bruchückenverschluß («Pektineusplastik») Alternative: Umwandlung in eine Leistenhernie (modifizierte Shouldicereparation)
Nabelhernien, paraumbilikale Hernien, epigastrische Hernie	
Bruchpforte <2cm	direkter Bruchlückenverschluß
Bruchpforte >2cm	Sublay Netzplastik Alternative: IPOM (laparoskopisch)
Kindliche Hernien	Bruchlückenverschluß nach der Methode Cerny oder Ferguson
sekundäre Bruchformen (Narbenbrüche)	
Bruchpforte <2cm	direkter Bruchlückenverschluß
Bruchpforte >2cm	
anatomische Rekonstruktion möglich	Sublay Netzplastik Alternative: IPOM (laparoskopisch)
anatomische Rekonstruktion unmöglich	Inlay-Onlay Netzplastik

¹ aus Leitlinie: Leistungsangebot Bauchwand- und Hernienchirurgie
Version 1.0
Stand 09/2006