


Leitlinie

1 Leistungsangebot Bauchwand- und Hernienchirurgie

BAUCHWAND UND HERNIEN	
primäre Bruchformen	
Leistenbruch	
Verschluß ohne Fremdmaterial	Shouldicereparation, Alternative: Bassini (Kirschner)plastik, Bassini-(Lotheissen)plastik
Verschluß mit Fremdmaterial (Netze), spannungsfrei	Lichtensteinreparation, TAPP (laparoskopisch)
Schenkelbruch	kruraler Bruchlückenverschluß («Pektineusplastik»). Alternative: Umwandlung in eine Leistenhernie (modifizierte Shouldicereparation)
Nabelhernien, paraumbilikale Hernien, epigastrische Hernie	
Bruchpforte <2cm	direkter Bruchlückenverschluß
Bruchpforte >2cm	Sublay Netzplastik, Alternative: IPOM (laparoskopisch)
kindliche Hernien	Bruchlückenverschluß nach der Methode Cerny oder Ferguson
sekundäre Bruchformen (Narbenbrüche)	
Bruchpforte <2cm	direkter Bruchlückenverschluß
Bruchpforte >2cm	Sublay Netzplastik Alternative: IPOM (laparoskopisch)
anatomische Rekonstruktion möglich	Sublay Netzplastik Alternative: IPOM (laparoskopisch)
anatomische Rekonstruktion unmöglich	Inlay-Onlay Netzplastik

Management bei (Bauchwand)hernien



¹ Leitlinie: Leistungsangebot, Management Bauchwand- und Hernienchirurgie
Version 1.0
Stand 09/2006

